

УДК 595.729

А. В. Горохов

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург

**ИСПРАВЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННЫХ УПУЩЕНИЙ
В СТАТЬЯХ А. В. ГОРОХОВА,
КАСАЮЩИХСЯ ИНДО-МАЛАЙСКИХ СВЕРЧКОВЫХ
(ORTHOPTERA, GRYLLOIDEA)**

Указывается типовая местность для *Acanthogryllus asiaticus* Gog. и дается описание *Micrornebius spadiceus* sp. n.

В статье «Новые и малоизвестные таксоны прямокрылых подотряда Ensifera (Orthoptera) из тропиков и субтропиков» (Энтомологическое обозрение, 1990, т. 69, вып. 4, с. 820—834) не по вине автора было упущено указание типовой местности и материала для описываемого в ней нового вида *Acanthogryllus asiaticus* Gogochov (корректурa автором не проверялась в связи с его пребыванием в тот момент в экспедиции). Упущенные сведения приводятся здесь:

— Индия, дата и сборщик неизвестны, 1 самец (голотип).

В статье «Четыре новых вида сверчковых (Orthoptera, Grylloidea) из Вьетнама» («Систематика и экология насекомых Вьетнама», М., Наука, 1992, с. 28—33) выпал целый кусок рукописи (корректурa автору также не удалось проверить) между диагнозом *Micrornebius aquilus* Gogochov и разделом о роде *Xabea* Walker, в связи с чем читателю может показаться, что автор относит последний род к трибе Mogoiplistini семейства Mogoiplistidae, хотя, в действительности, автор считает его представителем другого семейства. Этот кусок рукописи содержал также описание нового вида, рисунки к которому были опубликованы в этой же статье. Выпавший текст приводится полностью ниже.

Micrornebius spadiceus Gogochov, sp. n.

Самец (голотип). Очень близок к *M. aquilus*, но отличается от него более светлым коричнево-рыжеватым телом с темно-коричневыми боковыми лопастями переднеспинки, 5-м члеником максиллярных щупиков почти равным по длине

их 3-му членику — рис. 1 (12), слабо затемненными боковой лопастью и вершиной спинной плоскости надкрылья, 1-й струной, сближенной со 2-й струной и отдаленной от зеркала, более или менее сближенными косыми жилками — рис. 1 (8), окраской ног с меньшей долей темно-коричневого и с большей долей светло-коричневого — рис. 1 (9, 10, 13) (проксимальные части передних и средних бедер темно-коричневые; задние бедра коричневатые), анальной пластинкой, слабо закругленной на вершине, и относительно небольшой генитальной пластинкой с округлой вершиной — рис. 1 (11) (церки обломаны).

Самка неизвестна.

Длина, мм: тела 4.8, переднеспинки 2.9, надкрылья 2.3, заднего бедра 3.

Вьетнам, пров. Куангнам-Дананг, о. Тям напротив г. Хойан, 28.III.1987, 1 самец (голотип) (И. С. Даревский). Голотип — в Зоологическом институте АН СССР, Ленинград.

От других видов рода отличается так же, как и *M. aquilus*, за исключением окраски.

Семейство Gryllidae
Подсемейство Oecanthinae
Триба Xabeini stat. n.